

naziv/logotip ADVION BUBAŠVABE GEL

namena, formulacija, boja	Insekticid, gel za direktnu primenu, svetlo žute do žute boje.
sastav generički naziv, teh. čistoća	Indoksakarb..... 0,6 % w/w CAS 173584-44-6 (S-enantiomer), CAS 185608-75-7 (R-enantiomer)
namena biocidnog proizvoda	Insekticid za suzbijanje buba švaba u zatvorenom prostoru i na otvorenim površinama, u ili oko prostora za stanovanje, industrijskih objekata, kancelarijskog prostora, industrijskih skladišta, objekata za stanovanje, prevoznih sredstava
izjava	PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU. PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI ZA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU
obeležavanj e biocidnog proizvoda	Obaveštenje o opasnosti H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domaćaja dece. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobođanje u životnu sredinu. P391 Sakupiti prosuti sadržaj. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
nadležni organ i br. dozvole	Rešenje za stavljanje u promet br. XXXXX izdato od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
proizvođač, zastupnik i distributer	Proizvođač: American Blending and Filling Laboratories Inc. 1731 Lakeside Drive, Waukegan Illinois 60085, SAD Zastupnik i uvoznik: Syngenta Agro d.o.o., 11070 Beograd, Omladinskih brigada 88b, tel. 011/31299 81
rok upotrebe	Rok upotrebe: 2 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje i broj šarže su utisnuti na ambalaži.
pakovanje	30 g

izjava **Skladištenje:** čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži u zasebnoj, suvoj prostoriji, pod ključem, odvojeno od namirnica i stočne hrane, izvan dohvata dece i neupućenih osoba, ne izlagati niskim ili visokim temperaturama.

Primjenjuje se samo kao biocidni proizvod za opštu i profesionalnu upotrebu.

U slučaju trovanja ili sumnje na trovanje pozvati **Centar za kontrolu trovanja VMA**, Beograd, 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ADVION BUBAŠVABE GEL

Insekticid, gel za direktnu primenu, svetlo žute do žute boje.

NAMENA

Advion Bubašvabe Gel je insekticid za suzbijanje buba švaba u zatvorenom prostoru i na otvorenim površinama, u ili oko prostora za stanovanje, industrijskih objekata, kancelarijskog prostora, industrijskih skladišta, objekata za stanovanje, prevoznih sredstava

SASTAV (AKTIVNA MATERIJA)

Indoksakarb (metil (S)-7-hloro-2,3,4a,5-tetrahidro-2-[methoksikarbonil-(4-trifluorometoksifenil)carbamooil]inden-1,2- e][1,3,4]oksadiazin-4a-karboksilat 0,6 % w/w
CAS 173584-44-6

MERE OPREZA PRILIKOM PRIMENE

Pri radu sa biocidnim proizvodom ne pušiti, ne jesti i ne piti. U slučaju dospevanja na kožu može izazvati alregijsku reakciju. Ako postoji mogućnost da sredstvo dospe na kožu, preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica tokom primene ovog biocidnog proizvoda. Ako dospe na kožu odmah je oprati obilno vodom i sapunom. Vidi PRVA POMOĆ. Obzirom da je štetan za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama, sprečiti dospevanja u vodene tokove ili površine.

Bezbednosni list dostupan na zahtev ili preko sajta www.syngenta.rs

Ovaj proizvod se primenjuje kao mamac samo na prostoru koji nije pristupačan deci i domaćim životinjama. Primena u prostoru gde ima hrane za ljude ili hrane za stoku se obavlja samo u pukotine gde se nalaze štetočine koje se suzbijaju. Ovaj preparat se može primeniti, odnosno staviti u unutrašnjost lovne posude ili slične opreme koja onemogućava da se proizvode učini lako dostupnim deci, domaćim životinjama i drugim ne ciljanim organizmima. Ostale preporuke za primenu videti u PRIMENA.

MERE OPREZA POSLE PRIMENE

Sa praznom ambalažu postupiti u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, 36/09). U slučaju ne namernog prosipanja ili kada se završi aktivna faza delovanja gela, isti se može pokupiti papirnim ubrusima i oni se mogu odložiti u komunalni otpad.

SKLADIŠTENJE

Advion Bubašvabe Gel čuvati u originalnom pakovanju, u odvojenoj, tamnoj, suvoj, provetrenoj i zaključanoj prostoriji, odvojeno od hrane i hrane za životinje, i izvan dohvata dece i neupućenih osoba, ne izlagati niskim ili visokim temperaturama.

PRIMENA

Advion Bubašvabe Gel je specijalno formulisan biocidni proizvod koji je atraktivan za razne vrste buba švaba, koji ima snačno privlačeće delovanje. Delovanje nije trenutno, već ima blago produženo delovanja nakon kontakta ili unošenja u organizam štetočina, što omogućava da se oni nakon kontakta sa gelom i dalje kreću kratko vreme, pa na taj način doprinose „rasejavanju“ ovog biocidnog proizvoda i na druge jedinke u kontaktu sa njima.

Aktivna materije u Advion Bubašvabe Gel deluje kontaktno i utrobno, delovanje je usmereno na blokadu natrijumovih kanala u nervnom sistemu insekata, što dovodi do njihove paralize i uginuća. Letani ishod nastupa 24 do 60 časova nakon unošenja ovog biocidnog proizvoda od strane buba švaba.

Indoksakarb ima jedinstveno mesto delovanja u odnosu na ostale biocidne proizvode koji se koriste za suzbijanje buba švaba. Advion Bubašvabe Gel je veoma efikasan za suzbijanje raznih vrsta buba švaba, kao što su nemačka buba švaba (*Blatella germanica*), američka buba švaba (*Periplaneta americana*), orientalna buba švaba (*Blatta orientalis*).

Primena je moguća u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, u vidu trakaste ili tačkaste primene gela u ili oko prostora za stanovanje, industrijskih objekata, kancelarijskog prostora, industrijskih skladišta, kuhinja, bolnica, škola, hotela, prevoznih sredstava, na svim prostorima gde se pojavljuju buba švabe.

Količina primene Advion Bubašvabe Gel je 0,5 g/m².

Pri primeni staviti najmanje 1 zrno gela prečnika 1 cm na površinu od 1 m², ili 5 zrna gela prečnika 5 mm na površinu od 1 m².

Jedno "zrno" gela prečnika 5 mm (veličine sitnijeg zrna graška) ima prosečnu masu od 0,1 g.

Jedno "zrno" gela prečnika 1 cm (veličine krupnijeg zrna graška) ima prosečnu masu od 0,5 g.

Bolje je postaviti gel na viša mesta, u manjim porcijama, nego na jednom mestu u većoj dozi primene.

Gel staviti na mestima kojima se buba švabe kreću u potrazi za hranom, u blizini njihovih gnezda ili mesta gde se okupljaju i gde su veoma aktivni.

Mesto primene treba obići svakih 7 do 14 dana, i prema potrebi ponoviti tretman.

- Ne primenjivati u prostoru gde se vrši priprema hrane ako postoji mogućnost da proizvod dođe u direktni kontakt sa hranom ili posuđem za njenu pripremu.
- Na primenjivati u prostoru gde borave bebe, deca i kućni ljubimci ako postoji mogućnost da oni dođu u direktni kontakt za ovim proizvodom.
- Ne primenjivati na prostoru koji se često čisti ili briše.
- Ne primenjivati na površinama koje se mogu zagrejati preko 50°C, u blizini peći, dimnjaka, saune, grejne lampe, dovoda vruće vode, kada primenjeni gel može da se istopi.
- Izbegavati postavljanje gela na mestima koja su direktno izložena suncu.
- Ako se primenjuje napolju, biti siguran da gel neće biti izložen padavinama i ispiranju kišom.
- Ne primenjivati u blizini odvodnih ili dovodnih kanala i vodotokova.
- Ne primenjivati na prostoru na kojem je kratko pre toga primenjeno neko repelentno sredstvo, odnosno ono koje deluje odbijajuće na buba švabe. Advion Bubašvabe Gel privlači buba švabe, pa svako sredstvo koje na njih deluje odbijajuće smanjuje efekat ovog biocidnog proizvoda.

U slučaju ne namernog prosipanja ili kada se završi aktivna faza delovanja gela, isti se može pokupiti papirnim ubrusima i oni se mogu odložiti u komunalni otpad.

Ne koristiti ako se očekuje da će se ptice hrani buba švabama koji budu tretirani ovim proizvodom, osim ako se onemogući pristup pticama, kao na primer da se postavi mreža koji sprečava njihovo dolazak na mesto gde se nalaze uginule buba švabe.

SIMPTOMI TROVANJA I PRVA POMOĆ

Simptomi i znaci trovanja: Obzirom da sadrži indoksakarb, može da izazove alergijsku reakciju na koži. Obzirom na vrstu pakovanja i način primene ne očekuje se izlaganje gutanjem. Nema opasnosti od udisanja obzirom na mali sadržaj aktivne materije. Obzirom na način primene nema opasnosti od dospevanja u oko.

Prva pomoć i lečenje: U slučaju poteškoća nakon udisanja izneti izloženu osobu na svež vazduh. U slučaju kontakta sa očima neophodno je odstraniti kontaktna sočiva, oko obilno ispirati vodom, najmanje 15 min. Odmah potražiti lekarsku pomoć. Pri kontaktu sa kožom neophodno je odmah ukloniti kontaminiranu odeću i obilno isprati kožu vodom i sapunom. Nakon gutanja ne izazivati povraćanje, obratiti se odmah lekaru. U lečenju se primenjuje simptomatska terapija. Nema specifičnog antidota.

U slučaju pojave neželjenih simptoma nakon upotrebe ovog preparata ili trovanja obavezno se obratiti lekaru i poneti ovo uputstvo. Za bliža uputstva o lečenju konsultovati **Centar za kontrolu trovanja VMA**, Beograd, Crnotravska 17, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa.

Advion® je zaštićeno ime Syngenta Group Company.

Navedene preporuke za primenu biocidnog proizvoda su rezultat dosadašnjih saznanja i iskustava proizvođača ovog proizvoda. Obzirom da biocidni proizvod može doći pod uticaj različitih faktora, kao što su nepravilan transport, skladištenje i upotreba, pojava rezistentnosti i slično, a koji nisu pod uticajem i kontrolom proizvođača ovog biocidnog proizvoda, isti ne može preuzeti odgovornost za moguće štete nastale pod uticajem faktora koji nisu pod njegovom kontrolom.