

BRODISAN[®] PRAH



KONCENTRAT ZA PRIPREMU MAMACA ZA SUZBIJANJE GLODARA

OPAVEŠTENJE O OPASNOSTI:

Štetno ako se proguta.

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.



PAŽNJA

OPAVEŠTENJE O MERAMA PREDOSTROŽNOSTI:

Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

Isprati usta.

AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

Odlaganje sadržaja u skladu sa nacionalnim propisima o upravljanju otpadom i bezbednom odlaganju ambalaže i ambalažnog otpada.

SASTAV:

- bromadiolon (CAS br. 28772-56-7).....0,1%

- Bitrex[®](denatonium benzoat) (CAS br. 3734-33-6).....0,1%

- nosač, boja..... do 100,0%

BRODISAN prah je koncentrat - smeša, za profesionalnu upotrebu, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i na poljima.

NAČIN DELOVANJA: BRODISAN prah je smeša na bazi bromadiolona. Nakon konzumiranja mamaca, aktivna supstanca, bromadiolon, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - PRIPREMA MAMACA: Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz...) ili nekim drugim hranljivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati 1 kesicu od 20g **BRODISAN praha** na 380 g žitarica (pšenica, kukuruz...). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.

ODGOVORNOST: Korisnik je dužan da čuva i koristi preparat na način i u uslovima koje je proizvođač propisao. Proizvođač se ograničava od svake odgovornosti za štetu koja je rezultat nepropisnog skladištenja ili upotrebe preparata.

PRIPREMU MAMACA VRŠITI ISKLJUČIVO PREMA SLEDEĆOJ TABELI:

Količina BRODISAN Prah	Količina žitarica	Količina dobijenog mamca
1 kesica (ukupno 20 g)	380 g	400 g
5 kesica (ukupno 100 g)	1.900 g	2 kg
10 kesica (ukupno 200 g)	3.800 g	4 kg
25 kesica (ukupno 500 g)	9.5 kg	10 kg

NAČIN PRIMENE MAMACA:

a) Za suzbijanje pacova (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*) napravljeni mamac se stavlja u količini od 80 do 120g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m² potrebno je postaviti oko 5 kutija.

b) Za suzbijanje miševa (*Mus musculus*) napravljeni mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m. Zanzavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

OPŠTE NAPOMENE:

Nositi zaštitne rukavice i zaštitnu odeću prilikom rukovanja ovom hemikalijom.

Izbegavati udisanje prašine.

Uginule glodare (pacove, miševe) sakupiti, spaliti ili zakopati u zemlju.

Mamce ne treba postavljati u blizini izvorišta, bunara i reka bliže od 20 m.

UPUTSTVO ZA PRVU POMOĆ: U slučaju unošenja smeše i mamaca oralnim putem izvršiti lavažu želuca (ispiranje) i odmah potražiti savet lekara (ako je moguće pokazati ovu etiketu). Nakon toga se obavezno obratiti Nacionalnom centru za kontrolu trovanja na telefone: 011 3608 440 i 3608 234. U slučaju trovanja životinja, obratiti se najbližoj veterinarskoj stanici i ako je moguće pokazati ovu etiketu. **ANTIDOT: VITAMIN K1.**

USLOVI SKLADIŠTENJA:

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvim, tamnim i dobro provetrenim mestima koja se zaključavaju. Čuvati van domašaja dece.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturama između -10°C i +40°C.

Zaštititi od svetlosti i vlage. Skladištiti odvojeno od hrane, aditiva... i sl.

NAPOMENA: BRODISAN prah sadrži gorku materiju, **Bitrex[®]**, koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamku.

PROIZVOĐAČ: EKOSAN d.o.o.; Beograd



ROK UPOTREBE: 3 godine od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži